









Substansnamn	Preparatnamn ex.			Antacida	Fe	Ca	Mg		
Antibakteriella betalaktamer, penicilliner									
amoxicillin	Amimox Imacillin	X	X						
fenoximetylpenicillin (pcV)	Kävepenin Tikacillin		X						
flukoxacillin	Heracillin		X						
pivmecillinam	Selexid Penomax	X	X						
amoxicillin + klavulansyra	Bioclavid Spektramox	X							
Cefalosporiner									
cefadroxil	Cefamox	X							
cefalexin	Keflex		X						
ceftibuten	Cedax		X						
Tetracykliner									
doxycyklin	Doxyferm	X		X	X	X		X ¹	X
tetracyklin	Tetracyklin		X	X	X	X	X		X
lymecyklin	Tetralysal	X		X	X	X	X		X
Makrolider, linkosamider									
erytromycin	Abboticin nov Ery-max	X ² X							
roxitromycin	Surlid		X						
klaritromycin	Klacid	X	X						
azitromycin	Azitromax	X	X ³	X					
telitromycin	Ketek	X	X						
klindamycin	Dalacin	X	X						

1 Långvarigt alkohobruk ger kortare halveringstid för Doxyferm

2 Abboticin novum skall intas omedelbart före måltid

3 Risken för magbiverkningar kan minska om läkemedlet tas tillsammans med mat

Substansnamn	Preparatna mn ex.			Antacida	Fe	Ca	Mg		
Fluorokinoloner									
ciprofloxacin	Ciprofloxacin	X	X	X	X	X	X		X
norfloxacin	Norfloxacin		X	X	X	X	X		X
levofloxacin	Tavanic	X	X	X	X	X			X
moxifloxacin	Avelox	X	X	X ¹	X	X	X		X
Sulfonamider och trimetoprim									
trimetoprim	Idotrim	X	X						
Sulfametoxazol + trimetoprim	Bactrim Eusaprim	X	X						
Övriga									
metronidazol	Flagyl	X	X					X	
tidnidazol	Fasigyn	X						X	
nitrofurantoin	Furadantin	X							
fusidinsyra	Fucidin		X						
metenamin	Hiprex	X	X	X					
linezolid	Zyvoxid	X	X					X	
fosfomycin	Monuril licens		X						
Medel mot tuberkulos									
rifampicin	Rimactan Rifadin		X	X					
isoniazid	Tibinide		X						
etambutol	Myambutol	X	X	X	X	X	X		
rifampicin + isoniazid	Rimactazid		X	X				X	
rifampicin + isoniazid + pyrazin	Rimcure		X	X				X	
rifampicin + isoniazid + pyrazin + etambutol	Rimstar		X	X				X	
rifabutin	Ansatipin		X	X	X	X	X		

Teckenbeskrivning



Intas i samband med måltid



Tas ej tillsammans med mat (minst 1 tim för eller 2 tim efter måltid)

Om kryss i båda ”matrutorna” är behandlingen oberoende av födointag.

~~Antacida~~

Antacida bör ej kombineras med preparatet

~~Ca~~

Kalciumpreparat bör ej kombineras med preparatet

~~Mg~~

Magnesiumpreparat bör ej kombineras med preparatet

~~Fe~~

Järnpreparat bör ej kombineras med preparatet



Alkohol ska undvikas under behandling



Risk för fotosensibilisering under behandling

Referenser:

www.fass.se läkemedelsfakta samt kapitel Alkohol och läkemedel

SFINX databas

Martindale

Fabrikantinformation via personlig kontakt