

Frågor inför STI-provtagning



Inför ditt besök på din mottagning kan detta dokument vara till hjälp för att provtagningen ska bli korrekt. Givetvis är detta frivilligt.

Prover kan tas från urin, urinerörsmynningen, ändtarmsöppning, svalget, från sår och blåsor samt genom blodprov. Det är därför viktigt att du talar om vad du vill testa dig för och vi behöver också veta var någonstans vi ska ta provet.

Du kan få klamydia och gonorré i kön, analt, hals och ögon, därför måste vi ta prov där infektionen kan ha kommit in i kroppen.

Vi vill veta hur vi ska ta provet:

1. Har du:

- Givit oralsex
- Tagit emot analsex (innefattar även fingrar och sexleksaker)

2.	Har du besvär?	Ja	Nej	Vet ej
	urinvägsbesvär/ont när du kissar			
	flytningar, mellanblödningar eller blödning i samband med samlag			
	har/haft ont nedtill i buken/underlivet/pungen eller ömma lymfkörtlar			
	sår utslag, blåsor eller underlivsklåda			
	andra besvär			
3.	Har du haft flera tillfälliga partners eller sex utomlands?			
4.	Har du kännedom om någon av dina partners haft flera tillfälliga partners eller haft sex utomlands?			

5. Använder du kondom?

- Alltid
- Oftast
- Ibland
- Aldrig