

Pneumokockvaccination vuxna

Personer 65 år och äldre samt vuxna < 65 år med vissa riskfaktorer

65 år och äldre: samtliga utan kontraindikation rekommenderas vaccination.

Vuxna < 65 år med vissa riskfaktorer: kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom/nedsatt lungfunktion, avancerad leversjukdom fibros/cirrhos, kronisk njursvikt, diabetes, neuromuskulär sjukdom, alkoholism samt personer med BMI över 40.

Rekommendation: Till dessa personer ges en dos Pneumovax® vid ett tillfälle. Revaccination rekommenderas för närvarande i regel inte.

Patienter med särskilt hög risk för pneumokockinfektion

Hög risk för pneumokockinfektion har patienter med:

1. Gravyt nedsatt immunförsvar på grund av primär immunbrist samt vid sekundära immundefekter till följd av sjukdom eller i anslutning till (innan (vaccinera helst innan!), under eller efter nyligen avslutad) immunsupprimerande behandling t.ex. med prednisolon minst 15 mg/dygn i flera veckor, cytostatika, metotrexat, azatioprin, ciklosporin, TNF-hämmare, annan biologisk behandling etc.
2. Anatomisk eller funktionell aspleni (inkluderar även patienter med sickle cell anemi och annan hemoglobinopati). Vaccination ism operativ mjälttextirpation.
3. Nefrotiskt syndrom
4. Cochleaimplantat
5. Likvorläckage
6. Cystisk fibros
7. Hematologisk stamcellstransplantation

Rekommendation:

- **För grupp 1-6** rekommenderas, för att ge en så bred serotypstäckning som möjligt, vaccination med både konjugatvaccin (Prevenar® - PCV13) och polysackaridvaccin (Pneumovax® - PPV23).

Till tidigare ovaccinerad: Ge kombinationsvaccination med först konjugatvaccin och senare polysackaridvaccin

Ge en dos Prevenar 13® följt av en dos Pneumovax® tidigast efter 8 veckor. Pneumovax® kan upprepas en gång fem år efter den första dosen.

Till person tidigare vaccinerad med Pneumovax ®

En dos Prevenar 13® ges tidigast ett år efter senaste dosen Pnevovax®. Pneumovax® kan upprepas en gång när det gått minst fem år sedan föregående dos Pneumovax®.

Till person tidigare vaccinerad med konjugatvaccin (Prevenar, Prevenar 13 eller Synflorix):

Ge en dos Pneumovax® tidigast 8 veckor efter senaste dos konjugatvaccin. Pneumovax® kan upprepas en gång när det gått minst fem år sedan första dosen.

- **För grupp 7** ta kontakt med Infektionskliniken för samråd.