

PNEUMOKOCKVACCINATION AV VUXNA

Personer 65 år och äldre och patienter med vissa riskfaktorer

Exempelvis kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom - nedsatt lungfunktion, levercirrhos, kronisk njursvikt, svårbehandlad/instabil diabetes, neuromuskulär sjukdom, alkoholism samt personer med BMI över 40.

Personer med kraftigt ökad risk för att drabbas av pneumokockinfektion

- **Gravt nedsatt immunförsvar** på grund av sjukdom eller behandling, till exempel organtransplanterade, cytostatikabehandlade eller behandling med motsvarande >15 mg prednisolon/dag, annan kraftigt immunsupprimerande medicinering eller TNF-hämmare i kombination med annan behandling (till exempel metotrexat). HIV-patienter med suboptimal behandling.
- **Nedsatt mjältfunktion** Anatomisk eller funktionell aspleni.
- **Nefrotiskt syndrom**
- **Cochleaimplantation**
- **Likvorläckage**
- **Cystisk fibros**
- **Hematologisk stamcellstransplanterade** - kontakta Infektionskliniken!

Ovaccinerad

0 mån

Pneumovax®
0,5 ml

2 mån

Revaccination
rek ej

5 år

Fått en eller flera
doser
polysackaridvaccin
mot Pneumokocker

Revaccination
rek ej

Ovaccinerad

Prevenar 13®
0,5 ml

Pneumovax®
0,5 ml (2 mån)

Pneumovax®
0,5 ml (5 år)

Fått en eller flera
doser
polysackaridvaccin
mot Pneumokocker
(ex Pneumovax)

Prevenar 13®
0,5 ml tidigast
1 år efter
polysackarid-
vaccin

Pneumovax®
0,5 ml (5 år)

Fått en eller flera
doser
konjugatvaccin (ex
Prevenar, Synflorix)
mot Pneumokocker

Pneumovax®
0,5 ml tidigast
2 mån efter
konjugatvacc

Pneumovax®
0,5 ml (5 år)