



2017-02-16

Rekommendationer om vaccination mot difteri och stelkramp till vuxna

Enligt rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp (Socialstyrelsen, 2009) bör fulldosvacciner användas vid kompletterande vaccination av vuxna med bristfällig grundvaccination. Monovalenta vacciner mot difteri och stelkramp har varit tillgängliga som licensprodukter. Vaccin mot enbart difteri tillverkas dock inte längre och det råder även brist på monovalent vaccin mot stelkramp.

På grund av brist på monovalenta fulldosvacciner rekommenderar Folkhälsomyndigheten att använda difteri- och stelkrampsvaccin med reducerad antigenhalt (dT-vaccin) för grundvaccination av vuxna.

I det fall kombinationsvaccin mot enbart difteri och stelkramp (dT-vaccin) inte är tillgängligt kan kombinationsvaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta (dTp-vaccin) användas både för grundvaccination och påfyllnadsdoser.

Grundvaccination mot difteri och stelkramp består av tre doser. Intervall mellan den första och andra dosen ska vara minst en månad, den tredje dosen ges minst 6 månader efter dos 2. För ett långvarigt skydd mot sjukdomarna behövs upprepade påfyllnadsdoser som ges enligt rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp (Socialstyrelsen, 2009).

Aktuella vacciner

Vaccintillgång kan variera beroende på regionala avtal och eventuella restnoteringar.

dT-vaccin

diTeBooster

TD-RIX (ersättningsprodukt till diTeBooster, på licens)

dTp-vaccin

diTekiBooster

Boostrix