



Smittsamhet vid hiv

Smittskyddets kontaktsjuksköterskedag

25 februari 2020

Ann-Louise Svedberg Lindqvist

Kort sammanfattning

- Upptäck infektionen tidigt!
- Det finns ingen risk för överföring av hiv vid vaginala och anala samlag om personen har välinställd behandling
- Smittöverföring vid graviditet och förlossning är mycket låg om behandling sätts in i tid och mamman har omätbara virusnivåer i blodet
- Välinställd = kontinuerligt omätbara virusnivåer i blodplasma
+
god följsamhet till behandling och kontroller
- Personen har informationsplikt vid tillbud med risk för smitta till annan person



Folkhälsomyndigheten

Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion

– en sammanfattning och praktiska råd

2015



Folkhälsomyndigheten


Smittsamhet vid
behandlad hivinfektion

2019

Ex. på förhållningsregler vid välinställd hiv-behandling

- **Måste informera hälso-och sjukvården tidigt i graviditeten för att skydda barnet**
- **Får inte amma**
- **Har ingen skyldighet att använda kondom men rekommenderas att göra det som skydd för annan STI**
- **Blod ska alltid hanteras som smittfarligt:**
 - informera om "blodsmitta" i kontakt med sjukvård som innebär högre risk för stick- och skärskador ex. kirurgiska ingrepp, ej vid enklare us inom tandvård eller sjukvård som provtagning eller injektioner
- **Om någon kommer i kontakt med personens blod (via öppet sår eller stick/skärskador) måste de informera om att de har hiv.**

Målet är att så få personer ska smittas!



Några funderingar...

- Provtar vi tillräckligt?
- Hur når vi personer med ökad risk att smittas?
- Hade PrEP varit ett alternativ för denna person?

Vem bedöms vara aktuell för PrEP?

Faktorer som kan tala för att en person löper hög risk för att smittas med hiv:

- MSM med två eller fler episoder av genomgången gonorré
- och/eller klamydia analt
- och/eller infektion med lymfogranuloma venerum oavsett lokal (oral, uretralt och/eller analt) under den senaste 2-års perioden
- och/eller syfilis den senaste 5-års perioden

PrEP- vad är det?

- PrEP ges i form av läkemedel innehållande tenofovir/emtricitabine (Truvada®)
- Ska ges tillsammans med andra smittförebyggande åtgärder (riskreducerande samtal, stöd och hjälp för ev. missbruk, kuratorskontakt)
- Förskrivning bör endast ske av eller i nära samarbete med läkare och mottagningar med erfarenhet av hiv-behandling.

Mer om PrEP

- PrEP utgör inte ett 100%-igt skydd mot hiv (cirka 86%)
- PrEP skyddar inte mot andra STI vilket kondom gör
- Finns potentiella biverkningar (njurfunktion och benmineralisering)
- Bedömning är att ca 500 pers skulle vara aktuell för PrEP